

AVERTISSEMENTS AGRICOLES



STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE
DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE
ET DE LA FORÊT
SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX
Ancienne Conserverie de CASAMOZZA
LUCCIANA - 20290 - BORGO

Tél. 95.36.05.70



EDITION CORSE

Bulletin Technique N°128
du 22 Août 1988

VIGNE

La maturité des raisins semble être plus précoce cette année, qu'en 1987 (environ 8 jours). Les cépages Pinot, Chardonnay commencent d'ailleurs à être vendangés cette semaine.

<<. Tenez compte de la date probable de vendange pour effectuer vos derniers traitements .>>

**** Tordeuses de la grappe**

Sur les cépages à grappes serrées, vérifiez la présence de chenilles à l'intérieur des grappes. Si 10 % des grappes sont attaquées, effectuez un traitement à base de parathion dès maintenant.

Si vous observez en même temps des **cochenilles farineuses**, vous pouvez réaliser ce même traitement avec de l'ULTRACIDE ou de l'EKALUX.

**** Pourriture grise**

--> Vous avez déjà effectué deux traitements: fermeture de la grappe et début veraison, vos vendanges auront lieu avant le 15 septembre ? **Ne traitez plus.**

--> Vous n'avez effectué aucun de ces deux traitements et vous envisagez un traitement un mois avant la récolte ? **Ne traitez pas**, ce traitement n'aurait pas d'efficacité.

--> Vous avez déjà effectué un ou deux traitements contre le botrytis et vos vendanges risquent d'être tardives ? ce dernier traitement n'est pour l'instant pas nécessaire. Attendez. Il pourra l'être si on observe une alternance de petites pluies et de périodes chaudes. Ce traitement devra de toutes façons être réalisé **trois semaines avant récolte.**

**** Mildiou, oïdium**

Les traitements ne sont plus nécessaires .

**** Cicadelles vertes**

Un traitement s'avère indispensable dès que l'on observe 50 larves pour 100 feuilles.

=====

DELAIS AVANT RECOLTE

=====

... Assurez vous que les pesticides présentent un délai d'emploi suffisant avant récolte.

-- Les fongicides à base de phtalimides (captafol, folpel, captane) sont déconseillés dans les 30 jours qui précèdent la récolte; le captafol a d'ailleurs fait l'objet d'un retrait d'homologation.

-- L'emploi de spécialités à base de benzimidazoles (carbendazime, benomyl et méthylthiophanate) doit cesser dès la veraison...

=====

AGRUMES

De nombreux parasites sont présents dans les vergers : pucerons, aleurodes, acariens, larves de cochenilles . Un traitement insecticide généralisé doit avoir lieu avant la fin du mois. Bien mouiller la végétation 2000 à 2500 l/ha l'efficacité insecticide du produit sera renforcé par l'adjonction de 1 % d'huile blanche d'été dans la bouillie.